



Kirurgisk Klinik Horsens

Speciallæge Tobias Boest

Information om kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm - Gastroskopi

Gastroskopi er en kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Ved undersøgelsen føres en tynd kikkert via et næsebor eller munden til spiserøret og videre.

Slimhinden i næsebor og svælg lokalbedøves, inden kikkerten føres ind. Der blæses luft gennem kikkerten. Det kan stramme lidt i maven. Ofte tages vævsprøver gennem kikkerten. Dette er typisk helt smertefrit.

Undersøgelsen varer 2-5 minutter. Du ligger på venstre side under undersøgelsen. Der er rigeligt plads til at trække vejret under hele undersøgelsen. Kikkerten kommer IKKE i nærheden af luftrøret.

Før undersøgelsen

Får du **syrehæmmende** behandling, skal der holdes pause i 14 dage inden undersøgelsen.

Får du **blodfortyndende** medicin, kan du fortsat anvende denne, såfremt behandlingen er velreguleret. Er du i tvivl, så kontakt din læge.

Du skal være FASTENDE i minimum 6 timer inden undersøgelsen. Du må heller ikke ryge eller tygge tyggegummi. Der må dog indtages et glas klar væske (eks. vand) indtil 2 timer inden undersøgelsen. Du må tage din vanlige medicin indtil 2 timer inden undersøgelsen.

Efter undersøgelsen

Du må først spise og drikke 1 time efter undersøgelsen.

Du kan være øm i halsen efter undersøgelsen. Dette kan være op til en uge. Får du feber, åndedræts- eller synkebesvær, skal du kontakte klinikken, din egen læge eller vagtlægen.

Resultatet af undersøgelsen

Du får besked om fund og resultater umiddelbart i forlængelse af undersøgelsen. Er der taget vævsprøver, vil du modtage besked pr. mail eller telefon, når de foreligger. Det kan aktuelt vare op til 8 uger.

Din egen læge modtager en kopi af undersøgelsens resultat med det samme.